

HIVATALOS VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS

2026/II.

A VÉDEKEZÉS ELVÉGZÉSE MINDEN TERMELŐ SZÁMÁRA KÖTELEZŐ!

1. INDOKLÁS

Az amerikai szőlőkabóca imágók megjelenése 2026. 07. 14. napján megkezdődött. A kártevő terjeszti a szőlő arany színű sárgaság betegséget okozó (FD) fitoplazmát, mely betegség gyógyíthatatlan. A védekezés célja a járvány megfékezése.

Bővebb információ az FD-ről és az amerikai szőlőkabócáról az alábbi linken érhető el: <https://portal.nebih.gov.hu/fd-betegseg>

2. JOGSZABÁLYI ALAP ÉS SZANKCIÓK

Az (EU) 2016/2031 rendelet, a 2008. évi XLVI. törvény és a 7/2001. (I. 17.) FVM rendelet jogszabályi előírásaival összhangban az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés kötelező. A kezeléseket a közzétett védekezési felhívásokban meghatározott időzítés figyelembevételével szükséges elvégezni. A mulasztás növényvédelmi bírságot, a támogatások megvonását vagy az ültetvény kivágását vonhatja maga után.

3. HATÁRIDŐK ÉS ÜTEMEZÉS

Stádium	Optimális időpont	Művelet
Kifejlett alak (imágó)	2026. augusztus 07-17. között, További kezelések előrejelzési adatok, sárga ragacslapos megfigyelés szerint a szüreti és azt megelőző ételmezés-egészségügyi várakozási időszak kivételével. NÉBIH szükségshelyzeti engedély kiadása esetén szeptember végéig	Permetezés

4. ENGEDÉLYEZETT SZEREK

Részletes rovarölő szer lista mellékelve, illetve a NÉBIH honlapján vagy az alábbi linken:

<https://portal.nebih.gov.hu/documents/10182/1504431079/Engedelyezett+rovarolo+szerek.pdf>

5. HASZNOS TUDNIVALÓK A HATÉKONYSÁGÉRT

- Permetlé fedettsége: Ügyeljen a teljes lombfelület és a levelek fonákának megfelelő permetborítására.
- Szerfelhasználás: Javasolt legalább **több alkalommal felszívódó készítményt alkalmazni** a tartós hatás érdekében. **Fontos a terület egységre szükséges rovarölő szer kijuttatása!**
- Bővebb információ és technológiai segédlet:

KONVENCIONÁLIS

[Amerikai szőlőkabóca - Integrált növényvédelmi technológia összefoglalása](#)

ÖKOLÓGIAI MŰVELÉS

[Az arany színű sárgaság és az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ajánlott technológiája ökológiai művelésben - Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet](#)

6. HATÓSÁGI SZEMÉLYEK ÉS HEGBÍRÓK ELÉRHETŐSÉGE

Bővebb információért forduljon bizalommal a növényvédelmi hatósághoz (Tel.: 92/ 550-160, E-mail: noveny.talajvedelem@zala.gov.hu) és a hegybíróhoz (83/362-089).

2026. augusztus 04.

Zala Vármegyei Kormányhivatal AF Növény- és Talajvédelmi Osztály

A Zala Vármegyei Kormányhivatal, mint növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró szerv (továbbiakban: élelmiszerlánc-felügyeleti szerv) a **szőlő arany színű sárgaság betegséget okozó *Grapevine flavescence dorée phytoplasma* zárlati károsítót terjesztő amerikai szőlőkabóca** ellen az alábbi 2026. évre vonatkozó második védekezési felhívást teszi közzé a **Zala vármegye összes szőlő területén elvégzendő 3. kötelező védekezésre:**

VÉDEKEZÉSI FELHÍVÁS 2026/II.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv 2026. évben is folyamatosan vizsgálja a szőlő területen az amerikai szőlőkabóca (*Scaphoideus titanus*) egyedfejlődését és egyedszámának alakulását. A 2026. július 09-én elvégzett felmérés szerint egyes szőlőültetvényekben még megtalálhatóak voltak a kabóca utolsó (L₅) lárvastádiumú egyedek, ami azt jelenti, hogy feltehetőleg augusztus első napjaiban az összes egyed már teljesen kifejlődik repülésre is képes imágóvá. Emellett a vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a korábbi évek hasonló időszakához képest a kihelyezett sárgalapok kevesebb kifejlett alakot fogtak. A felhagyott, illetve hagyományos ültetvényben még a védekezési küszöb környéki a kabóca egyedszáma, az ökológiai ültetvényben már jóval az védekezési küszöb feletti. Ezt támasztják alá a csapdázási pontokon elvégzett hálózások eredményei is, mely szerint egyes ökológiai művelésben részesített szőlőültetvényekben növényenként legalább 1-2 kifejlett kabóca volt megtalálható.

A vizsgálatok eredményei alapján, ezért a **harmadik kötelező védekezést augusztus első felében, de legkésőbb augusztus 17. napjáig szükséges elvégezni valamennyi szőlőtermő területen a szüret időpontja és az élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartásának lehetősége szerint.**

Az ökológiai ültetvényekben a nagyobb egyedszám miatt a védekezést már a megadott periódus elején ajánlott végrehajtani.

Fontos hangsúlyozni, hogy a növényvédő szerek kijuttatása önmagában nem elegendő, a hatékonyságukat ellenőrizni is kell, és szükség esetén – valamint a további esetleges betelepülések miatt – a kezelés megismétlése válhat indokolttá. Ezért elengedhetetlen a kártevő népességének a megfigyelése. A szaporítóanyag előállító területeken legalább 3 színcsapdát kell kihelyezni hektáronként. Termő ültetvényekben az ajánlott sűrűség 5 ha-os táblaméretig 3 csapda/ha, 5–10 ha összefüggő táblaméretig 2 csapda/ha, és 10 ha feletti összefüggő táblaméret esetén 30 csapda/ültetvény. Hetente két alkalommal szükséges a csapdafogást leolvasni, illetve a lombozaton az imágók jelenlétét megfigyelni. A fogások alapján kicsi a kifejlett alakok populációsűrűsége, ha a fogott egyedek száma átlagosan 4 egyed/csapda/10 nap, közepes, amennyiben 4–15 egyed/csapda/10 nap a fogás és magas, ha a csapdázott imágók száma nagyobb, mint 15 egyed/csapda/10 nap. A védekezési küszöbérték 4 egyed/sárga lap/10 nap.

Fontos, hogy a fitoplazmát terjesztő **amerikai szőlőkabóca repülésre képes imágója át tudja vinni a fertőzött tőkéről egészséges tőkére a kórokozót táblán belül és táblák között is.**

Szaporítóanyag-előállító területek – ideértve a törzsültetvényeket és faiskolákat – a védekezés kötelező, függetlenül attól, hogy az adott területen észleltek-e kabócát.

Alkalmazható készítmények és technológiák

A védekezésre a felhívás 1. sz. mellékletének (Nébih honlapján elérhető [Szőlőben kabócafajok ellen engedélyezett rovarölő szerek](#)) táblázatában szereplő rovarölő szerek alkalmazhatók.

A konvencionális szőlőültetvények esetében a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara által elkészített védekezési technológia elérhető az [Amerikai szőlőkabóca - Integrált növényvédelmi technológia összefoglalása](#) linken.

Az ökológiai szőlőültetvények esetében az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet által elkészített védekezési technológia elérhető [Az arany színű sárgaság és az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ajánlott technológiája ökológiai művelésben - Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet](#) linken.

Lényeges, hogy a kezelések során olyan növényvédő szereket használjon a szőlőtermelő, amelyek a kijuttatás fenosztádiumában még engedélyezettek, az élelmezés-egészségügyi várakozási idő pedig betartható legyen, valamint **az engedélyokirat által előírt növényvédelmi technológia (lásd 1. sz. melléklet) pedig nem zárja ki a kifejezett alak elleni alkalmazásukat.**

Mivel a táblázat a növényvédő szerek jelen felhívás kiadásának napján hatályos engedélyokiratai alapján készült, ezért az engedélyokiratokban történt módosításokat a készítmény felhasználása előtt ellenőrizni szükséges!

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv tájékoztatja a **Pyregard** rovarölő szer felhasználását tervezőket, hogy a készítmény felhasználása a területen szerződött növényvédelmi szakirányító által kitöltött, és az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv által jóváhagyott adatlappal lehetséges.

Rezisztenciakezelés és technológiai tervezés

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv felhívja a termelők figyelmét arra, hogy az integrált növényvédelem alapelveinek betartása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a rezisztencia kialakulásának megelőzésére. Ennek érdekében:

- a készítmények engedélyokiratában meghatározott maximális kezelésszámot be kell tartani,
- a hatóanyagok kiválasztását (rotációját) és alkalmazását tudatosan kell megtervezni,
- valamint a későbbi kezelésekhez olyan készítményeket kell tartalékolni, amelyek az adott fenológiai állapotban még kijuttathatók és élelmezés-egészségügyi várakozási idejük is betartható.

AKG és ÖKO támogatásokhoz kapcsolódó kötelezettség

A szőlő arany színű sárgaság terjedésének megakadályozása érdekében:

- a KAP-RD19a-1-24 kódszámú „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések” (AKG),
- valamint a KAP-RD20a-1-24 kódszámú „Ökológiai gazdálkodás támogatása” (ÖKO)

pályázati felhívások keretében támogatott szőlőültetvényekben évente legalább két alkalommal kötelező növényvédőszeres védekezést végezni az amerikai szőlőkabóca ellen.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv vizsgálata szerint, a szőlő sárgaság betegség tipikus tünetei az idei évben vármegyénk néhány szőlő ültetvényében már 2026. 06. 10. napján, tömegesen július közepe táján jelentek meg. A levelek sodródása és a levéllemezek elszíneződése megkezdődött, valamint a virágzatok elszáradása már megtörtént, egyes fajtáknál a bogyók töppedése is megindult. A **szőlő arany színű sárgaság betegség elleni védekezés másik pillére ebben az időszakban a szőlő növények folyamatos szemlézése, illetve a tüneteket mutató, a fertőzés forrását és a betegség fennmaradását biztosító tőkék leveles hajtásrendszerének eltávolítása a növényvédő szeres kezelés elvégzését követően.** Fontos, hogy ez után a tőke gyökerestől történő kivágása megtörténjen, akár a vegetáció végét követően is, illetve, a kivágott

tőke helyét megjelölik. A vonatkozó jogszabályok szerint a tünetes szőlő növények azonosítását követően, annak bejelentése kötelező az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv részére, még a leveles hajtások eltávolítása, a tőke kivágása előtt.

A hatékony védekezés feltétele, hogy minden szőlőtermelő védekezzen a védekezési felhívások figyelembevételével, és ne veszélyeztesse a szomszédos termelők növényvédelmi, növény-egészségügyi biztonságát a védekezés elmulasztásával.

A növényvédőszeres védekezéshez felhasználható készítmények listáját a felhívás *1. sz. melléklete* ([Szőlőben kabócafajok ellen engedélyezett rovarölő szerek](#)) tartalmazza.

Zalaegerszeg, 2026. augusztus 04.

dr. Cseresnyés Béla főispán
nevében és megbízásából:

Szabó Béla
osztályvezető

Kapják:

1. Zala vármegyei települések önkormányzatai kihirdetésre (elektronikusan)
2. Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara Zala vármegyei Szervezete (elektronikusan)
3. Zalaszentgróti Hegyközség (elektronikusan)
4. Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növényvédelmi Igazgatósága (ni@nebih.gov.hu)
5. Hegyközségek Nemzeti Tanácsa (hnt@hnt.hu)

Amerikai szőlőkabóca ellen engedélyezett rovarölő szerek

(Forrás: Növényvédő szerek adatbázisa, NÉBIH. Lezárva: 2026. április 22.)

Készítmény	Hatóanyag	Forgalmi kategória	Kiszerezés	A legkisebb kiszerezéssel lekezelhető terület	A kezelések max. száma / év	Élelmezés eü. várakozási idő (nap)	Alkalmasság a lárvák és/vagy az imágók elleni védekezésre	Hatásmechanizmus	Méh-veszélyesség
Decis	deltametrin	III.	5×3 ml 50 ml	5×200 m ² 3333 m ²	2	7	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten veszélyes esti permetezés
Decis Forte Detector, Nuyard	deltametrin	I. II.	≥100 ml 50 ml	1,3 ha 6.666 m ²	2	(bor) 30 (csem) 7	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten veszélyes esti permetezés
Decis Mega	deltametrin	II.	≥100 ml	666 m ²	3	7	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten veszélyes esti permetezés
Karate Zeon 5 CS Full 5 CS, Kendo 5 CS, Ninja Zeon 5 CS, Karate Zeon, Karate Zeon 050 CS	lambdacihalotrin	II. III.	≥200 ml 2,5; 5; 50 ml	8000 m ² 2,5 ml-100 m ²	2	7	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten veszélyes esti permetezés
Klartan 24 EW Mavrik 24 EW Monospel 24 EW	tau-fluvalinát	I. II.	0,2 l 3 ml	6.666 m ² 100 m ²	2	21	lárva, imágó	kontakt	nem veszélyes virágzásban nappal kijuttatható
Lamdex Extra (szármasztatott: Axiendo 2,5 WG, La-Cy Extra	lambdacihalotrin	III.	5; 50; 200 g; 1 kg; 5 kg	100 m ²	2	7	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten veszélyes esti permetezés
Mospilan 20 SG Gazelle 20 SG, Mospilan 20 SG Original, Rafting, Spilan 20 SG; Mospilan SG *	acetamiprid	I. II. III.	≥1 kg 100 g 4 g	2,6 ha 2.666 m ² 106 m ²	1 csak szőlő alanytelepen használható	nk	lárva	szisztemikus	csak szőlő alanytelepen használható
Carnadine Roslix, Silentium; Carnadine, Carnadine 200, Roslix	acetamiprid	I. II.	≥150 ml ≥2 ml	8.571 m ² 114 m ²	1 2026.04.21.- 2026.08.18.	(7)	lárva	szisztemikus	mérsékelten veszélyes esti permetezés
Exirel, Irazu	ciántraniliprol	I. II.	≥200 ml ≥20 ml	2.222 m ² 220 m ²	2	(10)	lárva	szisztemikus	veszélyes virágzásban nem

Megjegyzés: a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat előírásai (csomagoláson lévő / csomagoláshoz melléklet felhasználási utasítás) szerint történjen.

1. sz. melléklet

Amerikai szőlőkabóca ellen engedélyezett rovarölő szerek

(Forrás: Növényvédő szerek adatbázisa, NÉBIH. Lezárva: 2026. április 22.)

Sanium System Deltam System	flupiradifuron	II. III.	>500 ml ≤500 ml (4; 5; 6; 8; 10; 12; 50; 75; 100; 125; 250; 300; 500 ml)	0,4 % (10 l vízhez 40 ml)	1	14	lárva, imágó	szisztémikus	nem veszélyes virágzásban nappal kijuttatható
Sivanto Prime Sivanto Prime 200 S	flupiradifuron	I. II.	200 l 50 ml	400- 500 ha 1000-1250 m ²	1	14	lárva, imágó	szisztémikus	nem veszélyes virágzásban nappal kijuttatható
Sivanto Energy Sivanto Energy 85 E	deltametrin+ flupiradifuron	I.	≥250 ml	6.250 m ²	2	14	lárva, imágó	kontakt és szisztémikus	veszélyes virágzásban nem kijuttatható
Sumi Alfa 5 EC	eszfenvalerát	I.	≥0,25 l	8.333 m ²	2	14	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten veszélyes esti permetezés
Sumi Alfa 5 EW Sumicidin 5 EW	eszfenvalerát	I.	≥5 ml	166 m ²	2	21	lárva, imágó	kontakt	mérsékelten veszélyes esti permetezés
Pyregard ökológiai termesztésben is felhasználható	piretrin	I.	1 l	1,3 ha	2 2026.03.16.- 2026.07.13.	7	lárva, imágó	kontakt	veszélyes virágzásban nem kijuttatható
Laser, Nexsuba ökológiai termesztésben is felhasználható	spinozad	II.	≥500 ml	1,25 ha	2	(15)	lárva	kontakt	mérsékelten veszélyes esti permetezés
Laser Duplo ökológiai termesztésben is felhasználható	spinozad	II. III.	≥250 ml 2; 4; 5; 10; 20; 40; 100 ml	1,25 ha 2 ml-100 m ²	2	(14)	lárva	kontakt	mérsékelten veszélyes esti permetezés
Limocide ökológiai termesztésben is felhasználható	narancsolaj	II.	1 l	1 ha	6	1	lárva, imágó	kontakt	veszélyes virágzásban nem kijuttatható
Aza ökológiai termesztésben is felhasználható	azadirachtin A	II.	≥150 ml	500 m ²	2 2026.05.11.- 2026.09.07.	3	lárva, imágó	nem ismert	nem veszélyes virágzásban nappal kijuttatható
NeemAzal-T/S ökológiai termesztésben is felhasználható	azadirachtin A	II. III.	≥2,5 l 25; 50; 100 ml; 1 l	8.333 m ² 25 ml-83 m ²	2 2026. 05.11.- 2026.09.07.	3	lárva, imágó	nem ismert	nem veszélyes virágzásban nappal kijuttatható

Megjegyzés: a készítmények felhasználása minden esetben az engedélyokirat előírásai (csomagoláshoz melléklet felhasználási utasítás) szerint történjen.